

## AUTORISATION DE VACCINATION HPV + RRO 2

### 2<sup>e</sup> DIFFERENCIÉE, 2<sup>e</sup> SECONDAIRE

Chers parents,

Dans le courant de cette année scolaire, notre service propose de vacciner gratuitement les élèves (filles et garçons) de 2<sup>e</sup> différenciée et 2<sup>e</sup> secondaire, qui souhaitent la **vaccination contre le papillomavirus (HPV) Gardasil 9** ainsi que le rattrapage de la **Rougeole/Rubéole/Oreillons (RRO2)**. Le vaccin HPV est administré selon un schéma en 2 doses, avec un intervalle de minimum 5 mois entre celles-ci, selon les recommandations de l'ONE.

Cette vaccination sera réalisée **à l'école**, qui vous informera des dates du passage de l'équipe PSE.

Pour obtenir la traduction de cette autorisation, veuillez scanner ce QR Code :



Pour que votre enfant soit vacciné par notre service, il faut absolument :

- ⚠ **Signer, dater et remplir l'autorisation ci-dessous.**
- ⚠ **Joindre une copie de la carte de vaccination ou du carnet de santé ONE.**
- ⚠ **Remettre le tout à l'école le plus rapidement possible**

L'équipe médicale PSE

Nom et prénom de l'élève : .....

Date de naissance : .....

Adresse : .....

GSM responsable 1 : ..... GSM responsable 2 : .....

Ecole : ..... 2<sup>e</sup> ..... (A, B, C ou autre)

Ecole fréquentée en primaire : .....

J'autorise l'équipe médicale du PSE à vacciner mon enfant, sous ma responsabilité contre :

- ☐ Le papillomavirus (HPV), **GARDASIL 9** (cet accord couvre les 2 doses du schéma vaccinal)
- ☐ Le RRO 2, **MMRVAX-PRO**
- ☐ Mon enfant sera vacciné par le médecin traitant / le gynécologue
- ☐ Actuellement, je refuse de faire vacciner mon enfant
- ☐ Mon enfant est déjà vacciné contre le HPV (dates : ..... ) et/ou RRO2 (.....)

Pour en savoir plus à propos de la vaccination HPV, n'hésitez pas scanner ce QR Code :



Date et signature du responsable (obligatoires)

.....

Numéro national de l'élève :

\_\_-\_\_-\_\_ / \_\_-\_\_-\_\_



## Réactions possibles après la vaccination :

Certains effets indésirables sont possibles, généralement sans gravité et ne durent que quelques jours : rougeur, légère douleur à l'endroit de l'injection, fièvre de courte durée.

Si ces effets indésirables perdurent, prenez contact avec votre médecin traitant.

Merci de nous communiquer toute **information importante** pour accueillir au mieux votre enfant lors de la vaccination.

Les données récoltées sont traitées dans le respect des législations européennes et nationales sur la protection des données à caractère personnel. Vous trouverez sur notre site internet toutes les informations détaillées relatives au traitement de ces données :



## CALENDRIER DE VACCINATION 2025-2026

|                                 |            | Nourrissons        |                     |                     |         |                      | Enfants et adolescents |         |                |           | Adultes             |                    |        |
|---------------------------------|------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------|----------------------|------------------------|---------|----------------|-----------|---------------------|--------------------|--------|
|                                 |            | 8 sem.<br>(2 mois) | 12 sem.<br>(3 mois) | 16 sem.<br>(4 mois) | 12 mois | 15 mois <sup>1</sup> | 5-6 ans                | 7-8 ans | 13-14 ans      | 15-16 ans | Femmes<br>enceintes | Tous les<br>10 ans | 65 ans |
| Poliomyélite                    | Hexavalent | ✓                  | ✓                   | ✓                   |         | ✓                    | ✓                      |         |                | ✓         | ✓                   | ✓                  |        |
| Diphtérie                       |            |                    |                     |                     |         |                      |                        |         |                |           |                     |                    |        |
| Tétanos                         |            |                    |                     |                     |         |                      |                        |         |                |           |                     |                    |        |
| Coqueluche                      |            |                    |                     |                     |         |                      |                        |         |                |           |                     |                    |        |
| Haemophilus influenza de type b |            |                    |                     |                     |         |                      |                        |         |                |           |                     |                    |        |
| Hépatite B                      | RRO        |                    |                     |                     |         |                      |                        |         |                |           |                     |                    |        |
| Rougeole                        |            |                    |                     |                     | ✓       |                      | ✓                      |         |                |           |                     |                    |        |
| Rubéole                         |            |                    |                     |                     |         |                      |                        |         |                |           |                     |                    |        |
| Oreillons                       |            |                    |                     |                     |         |                      |                        |         |                |           |                     |                    |        |
| Méningocoques ACWY              |            |                    |                     |                     |         | ✓                    |                        |         |                | ✓         |                     |                    |        |
| Pneumocoques                    |            | ✓                  | ✓ <sup>1</sup>      | ✓                   | ✓       |                      |                        |         |                |           |                     |                    | ✓      |
| Rotavirus (vaccin oral)         |            | ✓                  | ✓                   | ✓ <sup>2</sup>      |         |                      |                        |         |                |           |                     |                    |        |
| Papillomavirus (HPV)            |            |                    |                     |                     |         |                      |                        | ✓       | ✓ <sup>3</sup> |           |                     |                    |        |
| Grippe (Influenza)              |            |                    |                     |                     |         |                      |                        |         |                |           | ✓ <sup>5</sup>      |                    | ✓      |

- ✓ Recommandé à tous et gratuit
- ✓ Recommandé à tous, remboursé mais pas gratuit
- ✓ Recommandé à tous, partiellement remboursé selon la mutuelle
- Vaccin combiné (une seule injection)

**Hexavalent** : Vaccin qui confère une protection contre 6 maladies

**Virus respiratoire syncytial (RSV)** : une immunisation de la femme enceinte ou de l'enfant peut être proposée pendant la grossesse, à la naissance ou pendant les premiers mois de vie

- <sup>1</sup> Pour les bébés nés avant 37 semaines de grossesse, une dose supplémentaire de vaccin contre le pneumocoque est recommandée à 3 mois et les vaccins prévus à 15 mois seront administrés à 13 mois (hexavalent et méningocoques ACWY).
- <sup>2</sup> En 2 ou 3 doses en fonction du vaccin administré.
- <sup>3</sup> Vaccination en 2 doses à 6 mois d'intervalle (minimum 5 mois d'écart).
- <sup>4</sup> À partir de 24 semaines et idéalement avant 32 semaines de grossesse.
- <sup>5</sup> Pendant la saison grippale, quel que soit le stade de la grossesse.

Ce calendrier est susceptible d'être modifié au fil des ans. Votre médecin pourra éventuellement l'adapter à votre enfant, n'hésitez pas à discuter vaccination avec lui.

Pour plus d'infos :  
Consultez votre médecin traitant ou le site  
[www.vaccination-info.be](http://www.vaccination-info.be)

